



Les oiseaux rares en Région PACA Années 2004, 2005 et 2006

1^{er} rapport du Comité d'Homologation Régional PACA

Amine Flitti & le CHR PACA

Le Comité d'Homologation Régional a pour objet de récolter des données circonstanciées d'espèces rares et occasionnelles en Région PACA, afin de préciser leur statut à l'échelle régionale. Ces observations donnent lieu à la rédaction d'un rapport, mis à disposition de l'ensemble de la communauté ornithologique tant régionale que nationale. Le CHR PACA collecte, centralise et transmet également les observations régionales d'espèces rares au plan national, au Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR). Cela se matérialise chaque année par la publication d'un rapport annuel dans la revue d'ornithologie française *Ornithos*.

Ce premier rapport du Comité d'Homologation Régional pour la région PACA (CHR PACA) couvre les années 2004, 2005 et 2006. Le nombre de fiches examinées par le CHR pour cette période est de 252. Le taux d'acceptation atteint 91%, reflétant la qualité rédactionnelle des fiches qui nous sont parvenues. Le secrétaire du CHR PACA se tient à la disposition des observateurs ayant vu leur fiche(s) refusée(s).

Nous regrettons que de nombreuses observations ne se traduisent pas toujours par une fiche d'homologation. Rappelons que la plupart des publications font appel aux données homologuées. Ainsi, un nombre conséquent d'observations se perdent dans le dédale des listes de discussion...

Durant cette période, le CHR PACA était composé des 8 membres suivants : Damien Combrisson, Frank Dhermain, Guy Durand, Amine Flitti (secrétaire), Emmanuel Franc, Georges Olioso, Philippe Orsini, Yves Kayser. Philippe Orsini a décidé d'interrompre son mandat. Nous le remercions chaleureusement pour sa contribution. Nous lançons donc un appel à candidature. Merci de vous adresser au secrétaire.

Quelques décisions :

Parmi les principales décisions prises lors de la réunion plénière du 18/11/2006, la profonde modification de la liste des espèces soumises à homologation est à souligner. En effet, la présence de certaines espèces dans la liste ne se justifie plus. Ainsi, nous souhaitons recentrer le processus d'homologation sur les espèces vraiment rares (fournissant moins de 10 données par an). D'autre part, le Comité d'Homologation National (CHN) a révisé sa liste en 2006 en supprimant 16 espèces. Nous avons intégré au niveau régional la plupart de ces espèces dans notre liste. Vous pouvez prendre connaissance de cette nouvelle liste en fin de rapport.

En 2004, l'automne fut marqué par un phénomène migratoire inédit concernant l'Aigle botté, avec une rémanence importante en 2005 (GUILLOSSON & al., 2006). Du fait du nombre important d'observation depuis cette date, cette espèce a été retirée de la liste.

L'année 2005 a été marquée par un afflux exceptionnel de Jaseurs boréaux en France et dans notre région (PAUL J.-P. & OLIOSSO G., 2006). Nous avons donc décidé de ne pas mettre en place le processus habituel d'homologation pour l'année 2005. Mais bien sur, l'espèce reste soumise à homologation.

Parmi les autres espèces retirées de la liste, notons parmi d'autres, le Chevalier stagnatile, la Corneille mantelée ou encore le Goéland brun (sauf ssp *fuscus*).

Le CHR PACA a également pris la décision de ne valider l'homologation d'espèce basée uniquement sur le cri qu'au cas par cas.

LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses, les chiffres représentent respectivement le nombre de données et le nombre d'individus correspondant homologués en 2004, 2005 et 2006.
3. La distribution générale de l'espèce en période de nidification et d'hivernage est indiquée en italique.
4. Présentation des données par ordre alphabétique des départements.
5. Commune, lieu-dit, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus.
6. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
7. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
8. Date (s) d'observation.
9. Nom (s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo.
10. La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique occidental (CAF/LPO 2003).
11. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Grèbe jougris - un individu à Arles, Bouches-du-Rhône, le 14 janvier 2004 (Yves Kayser, in *Flitti & al.* 2007).

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* (2/3)

Dans le Paléarctique occidental, la population reproductrice s'étend de la Russie à l'Allemagne à l'ouest et à la Turquie au sud. Hivernent principalement le long des côtes du nord de l'Europe, de la mer Noire et de l'Adriatique.

Bouches-du-Rhône

Arles / Golfe de Beauduc, 2 ind., 14 janvier 2004 (Kayser Yves)

Vaucluse

Mondragon / Rhône, 1 ad., du 8 au 15 janvier 2006 (Oliosio Georges)

Cette espèce reste bien rare dans notre région.

CORMORAN HUPPE DE MEDITERRANEE *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* (1/1)

Sous-espèce endémique de la Mer Méditerranée et de la Mer Noire. Niche sur les Iles de Marseille et d'Hyères.

Bouches-du-Rhône

Arles / Golfe de Beauduc, 1 imm., 16 mai 2004 (Palomarès Vincent)

Rarement observé en Camargue. Homologation uniquement en dehors des Iles d'Hyères et de Marseille depuis le 1^{er} janvier 2007.

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (12/52)

La sous-espèce nominale est présente en sporadiquement dans le sud de l'Europe, mais aussi en Afrique du Nord, Asie centrale, Amérique du Nord et aux Grandes Antilles.

Bouches-du-Rhône

Arles / Mas d'Agon, 16 ind., 7 mars 2004 au 23 mars 2004 (Kayser Yves & al.)

Arles / Roquemaure, 2 ind., 26 mars 2004 (Durand Guy)

Arles / Basse Méjanes, 11 ind., 15 mai 2004 (Kayser Yves, Gauthier-Clerc Michel)

Arles / Marais du Vigueirat, 1 ind., 2 février 2005 (Péron Guillaume)

Arles / Mas d'Agon, max. 7 ind., 31 mars 2005 au 18 avril 2005 (Jacotot Gil, Martinez Nicolas, Kayser Yves, Franc Emmanuel & al.)

Arles / Paty de la Trinté, 1 ad., 18 avril 2005 (Kayser Yves)

Arles / Salin de Badon, 1 ind., photo¹, 26 au 28 août 2005 (Palomarès Vincent, Bazin Nicolas)

Arles / Saint-Seren, 5 ind., 1 septembre 2005 (Willm Loïc & al.)

Arles / Tour du Valat, 1 ind., 9 septembre 2005 (Kayser Yves, Dorgère A.)



¹ Ibis falcinelle, Arles, Salin de Badon, 26/08/05, V. Palomarès

Arles / Tour du Valat, 1 ad., 7 et 8 novembre 2005 (Kayser Yves, Pineau Olivier)

Arles / Fiérouse, 1 ad., photo, 18 avril 2006 (Hohener Patrick)

Arles / Mas d'Agon, 5 ind., 23 au 26 avril 2006 (Palomarès Vincent & al.)

Le décompte des individus observés en Camargue est particulièrement difficile à réaliser ! A noter que l'espèce s'est reproduite en 2006 en Camargue Gardoise. Depuis le 1^{er} janvier 2007, cette espèce n'est plus soumise à homologation en Camargue.

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (1/1)

Dans le Paléarctique, niche au nord du 55° N, en France, Espagne, Pays-Bas, en Europe orientale, à l'est jusqu'à la mer Caspienne. Les populations européennes hivernent sur le pourtour méditerranéen et au nord de l'Afrique tropicale.

Var

Six-Fours-les-Plages / Lagune du Brus, 1 ind., 3 juin 2004 (Cocardon Boris)

OIE RIEUSE *Anser albifrons* (1/1)

Niche dans la toundra arctique du nord de la Sibérie, à proximité de plans d'eau. En Europe, une partie de la population hiverne dans la zone de la mer Baltique, comprenant la Hollande, la Belgique, la Grande-Bretagne, à l'ouest jusqu'à la France ; la seconde hiverne dans la partie orientale : ex-Yougoslavie, Albanie, Grèce.

Vaucluse

Sauveterre-Sorgues / digue CNR, 1 ind. H1, 22 mars 2004 (Pataud Alain)

Cette oie demeure très rare en PACA.

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (3/7)

Niche ponctuellement en Afrique du Nord, et de la Grèce à l'Asie Centrale, La Mongolie, le nord de la Chine, en Sibérie au nord jusqu'au lac Baïkal. Populations férales en Europe.

Var

Six-Fours-les-Plages, 1 mâle, 14 novembre 2004 (Cocardon Boris)

Roquebrune-sur-Argens / Les Avellans, 5 ind., 16 septembre 2005 (Soldi Olivier)

Hyères / Salin des Pesquiers, 1 ad., photo², 23 et 24 juin 2006 (Issa Nidal)

Toutes les données parvenues concernent le Var. Il est difficile de se prononcer sur l'origine de ces individus. L'accumulation de données pourra peut-être permettre de dégager un pattern d'apparition.



FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (5/6)

Niche des Balkans et de l'Europe centrale jusqu'à l'Asie centrale, occasionnellement plus à l'ouest.

Alpes-Maritimes

Saint-Laurent-du-Var / Embouchure du Var, 2 imm., 30 août au 12 septembre 2004 (Kolbeinsson Yann & al.)

Bouches-du-Rhône

Cabriès / Réaltor, 1 mâle ad., 2 août 2004 (Durand Guy)

Saint-Paul-lès-Durance / Bassin de Cadarache, 1 mâle, 27 février 2005 (Forest Aymeric)

Vitrolles / Salins du Lion, 1 fem., 5 janvier 2006 (Franc Emmanuel)

Marignane / Le Barlatier, 1 mâle ad., photo, 26 mars 2006 (Thomazeau Yves)

Il convient d'être attentif à toutes traces d'hybridation chez cette espèce. Une description aussi précise que possible doit accompagner toute fiche concernant le Fuligule nyroca.

HARELDE BOREALE *Clangula hyemalis* (2/3)

Nicheur circumboréal, hiverne plus bas en latitude.

Bouches-du-Rhône

² Tadorne casarca, Hyères, 24/06/2006, N. Issa

Arles / La Comtesse, 2 fem., 4 mars 2006 (Borel C., Buton C.)

Var

Hyères / Salins des Pesquiers, 1 mâle juv., photo, 3 au 7 décembre 2004 (Lepoivre Christophe & al.)

Le nombre d'observation de ce canard nordique reste faible.

HARLE PIETTE *Mergus albellus* (2/2)

Niche de la Suède à la Sibérie orientale. Hivernent plus au sud, à l'intérieur des terres principalement.

Bouches-du-Rhône

Arles / Roquemaure, 1 fem. imm., photo, 1 décembre 2003 au 29 février 2004 (Gauthier-Clerc Michel & al.)

Saintes-Maries-de-la-Mer / Pont de Gau, 1 fem., 17 décembre 2005 (Palomarès Vincent)

Un individu par an, c'est une bonne moyenne !

HARLE BIEVRE *Mergus merganser* (1/12)

En Europe, niche dans les forêts septentrionales de Scandinavie et du nord de la Russie et de la Sibérie jusqu'à l'océan Pacifique. En hiver, présent au Danemark, sur la côte sud de la mer du Nord, en Allemagne et au Bénélux. Quelques-uns arrivent en Écosse, en Suisse (lac Léman) et en France sur la Seine, la Loire et le Rhin. En France quelques harles bièvres nichent sur le lac Léman, le lac d'Annecy et le lac du Bourget.

Hautes-Alpes

Embrun / Lac de Serre-Ponçon, 12 ind. dont 4 mâles, photo³, 7 mars 2006 (Franc Emmanuel, Jeangeorges Nathalie)

Hivernant très rare, cependant les Hautes-Alpes abritent une population hivernant régulière, d'où le retrait de l'espèce de la liste pour ce département à partir de 1^{er} janvier 2007.



PYGARGUE A QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (3/3)

Niche du Groenland au Japon, depuis la Méditerranée et les zones tempérées jusqu'aux régions boréales et à la toundra. Toujours lié à la proximité des milieux aquatiques.

Alpes de Haute Provence

Rougou, 1 ind. 2A, photo, 2 janvier 2005 et 18 février 2005 (Eliotout Bertrand, Henriquet Sylvain & al.)

Bouches-du-Rhône

Arles / Tour du Valat, 1 ind. H1, 17 janvier 2004 au 3 mars 2004 (Kayser Yves & al.)

Hautes-Alpes

Remollon, 1 ind. imm., 15 février 2004 (Carriat Jacques)

Un individu a hiverné en Camargue en 2004. A Rougou, les deux observations se rapportent probablement au même individu.

AIGLE ROYAL *Aquila chrysaetos* (2/2)

La sous-espèce nominale se reproduit des Pyrénées et des Iles Britanniques à la Sibérie occidentale et à l'Altai.

Bouches-du-Rhône

Arles / Amphise, 1 ind., 2A, photo, 12 octobre 2003 au 19 février 2004 (Flitti Amine, Bourgeois Henri & al.)

Arles / La Bomborinette, 1 ind. imm., 20 novembre 2004 (Zucca Maxime, Jarry Clémence)

L'hivernage d'un Aigle royal en Camargue n'était plus arrivé depuis plus de 10 ans. Cependant, cette espèce n'est plus soumise à homologation depuis le 1^{er} janvier 2007.

AIGLE BOTTE *Hieraetus pennatus* (26/36)

³ Harle bièvre, Embrun, 07/03/2006, E. Franc

L'Aigle botté se reproduit dans le sud de l'Europe, depuis l'Espagne et l'est du Portugal, l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud, jusqu'au Japon. Il hiverne en Afrique et en Inde. Nicheur exceptionnel en PACA.

Alpes-Maritimes

Saint-Laurent-du-Var / Embouchure du Var, 1 ind. clair, photo, 21 mars 2005 (Soldi Olivier, Kern Patrick)

Bouches-du-Rhône

Arles / Amphise, 1 ind. ad. sombre, 14 février 2004 (Flitti Amine, & al.)

Arles / Boisverdun, 1 ind. clair, 13 mai 2004 (Kayser Yves)

Arles / Mas d'Agon, 1 ind. clair, 1 novembre 2004 (Rufer Rémi & al.)

Arles / Basse Méjanès, 2 ind., 21 novembre 2004 (Zucca Maxime, Jarry Clémence)

Noves, 1 ind., 24 novembre 2004 (Durand Guy)

Arles / Amphise, 2 ind., photo, 27 novembre 2004 (Palomarès Vincent, Bazin Nicolas)

Arles / Mas Sénébier, 4 ind., photo, 8 janvier 2005 (Palomarès Vincent, Blanchon Thomas, Haas Grégory) et 5 ind. (4 clairs et 1 sombre), 17 février 2005 (Palomarès Vincent, & al.)

Arles / Carrelet, 1 E1 clair, 5 mars 2005 (Kayser Yves, Bouffet Claudine)

Arles / Tour du Valat, 1 E1 clair, 12 mars 2005 (Kayser Yves)

Arles / Amphise, 1 ind. clair, 31 mars 2005 (Jacotot Gil, Martinez Nicolas)

Arles / Fiélouse, 1 ind. clair, 7 avril 2005 (Franc Emmanuel, Jeangeorges Nathalie)

Arles / Marais du grenouillet, max. 3 ind., 23 et 24 avril 2005 (Franc Emmanuel, Peyre Olivier, Durand Guy, Issa Nidal, Baeta Renaud, Liger Alexandre)

Fos-sur-Mer / Déchetterie, 1 ind. clair, 25 avril 2005 (Issa Nidal, Baeta Renaud, Liger Alexandre)

Saint-Martin-de-Crau / Etang des Aulnes, 2 ind., 8 mai 2005 (Peignot Cédric, Nabholz Benoit)

Arles / Tour du Valat, 1 ind. clair, 12 mai 2005 (Kayser Yves)

Arles / Boisverdun, 1 ind. clair, 11 septembre 2005 (Kayser Yves, Thibault Marc & al.)

Arles / Tour du Valat, 1 ind. clair, 10 octobre 2005 (Kayser Yves)

Le Puy Sainte Réparate / Gravières, 1 ind. imm, 10 octobre 2005 (Durand Eric)

Arles / Boisverdun, 1 H1 clair, 6 novembre 2005 (Kayser Yves, Jourdain Elsa)

Le Puy Sainte Réparate / Gravières, 1 ind., 20 novembre 2005 (Delvoye Geneviève, Darmuzey Thierry, Canals Sophie)

Saintes-Maries-de-la-Mer / Pont de Sylvéréal, 1 ind. clair et 1 sombre, 22 décembre 2005 (Guillosso Tristan)

Var

Hyères, 1 ind. clair, 5 mai 2005 (Issa Nidal)

Taradeau, 1 ind., 11 septembre 2005 (Soldi Olivier)

Les Arcs, 1 ind., 15 octobre 2005 (Soldi Olivier)

Vaucluse

Vaison-la-Romaine, 1 ind. clair, 13 août 2006 (Moussiegt Laurent)

Depuis l'automne 2004, le nombre d'observation d'Aigle botté a été très important, sans compter les centaines d'individus comptabilisés au fort de la Revère, avec un décompte par ailleurs quasi impossible à réaliser pour les oiseaux de Camargue. Nous avons donc décidé de ne plus homologuer cette espèce à compter du 1^{er} janvier 2007.

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (2/2)

Sa vaste répartition s'étend de l'Espagne et le Portugal, l'Afrique du Nord jusqu'à l'Himalaya en passant par l'Asie centrale. Il fait l'objet de programme de réintroduction en France.

Bouches-du-Rhône

Orgon, 1 ind., 4 avril 2004 (Franc Emmanuel)

Gémenos, 1 ind., 13 juin 2004 (Pélissier Robert)

Peu de données nous sont parvenues malgré de nombreuses observations. Du fait de l'accroissement numérique de l'espèce (programme de réintroduction, échanges d'individus entre ces différents sites), l'espèce n'est plus soumise à homologation.

VAUTOUR MOINE *Aegyptus monachus* (1/1)

Il est présent de la péninsule ibérique à la Chine. Il fait l'objet de programme de réintroduction en France.

Bouches-du-Rhône

Arles / Marais du Vigueirat puis Boisverdun, 1 ind. 1A, 2 septembre 2005 (Kayser Yves, Massez Grégoire)

Cet individu a été observé par deux observateurs chanceux à quelques minutes d'intervalle ! Les programmes de réintroduction en cours favorisent bien sur l'observation de cette espèce.

FAUCON D'ELEONORE *Falco eleonora* (13/17)

La reproduction se déroule essentiellement en Méditerranée et sur les côtes atlantiques du Maroc et l'hivernage se produit à Madagascar et en Afrique de l'Est.

Bouches-du-Rhône

Arles / Etang Redon, 2 ad. forme claire, 2 juin 2004 (Kayser Yves, Paulus Guillaume)

Arles / Mas de Tamaris, 1 ad., 2 juin 2004 (Kayser Yves, Paulus Guillaume)

Arles / Grand Rascaillon, 1 ad., 25 septembre 2004 (Palomarès Vincent)

Arles / Peaudure, 1 ad. sombre, 12 mai 2005 (Kayser Yves)

Arles / Boisverdun, 2 ad. clair, 18 mai 2005 (Kayser Yves)

Arles / Tour du Valat, 1 ind. sombre, 5 septembre 2005 (Kayser Yves)

Arles / Boisverdun, 1 ad. clair, 13 septembre 2005 (Kayser Yves, Jourdain Elsa)

Arles / Mon Canard, 1 ad. sombre, 14 septembre 2005 (Kayser Yves)

Arles / Tour du Valat, 1 ad. clair, 22 septembre 2005 (Kayser Yves)

Arles / Boisverdun, 1 ad. sombre, 25 septembre 2005 (Kayser Yves)

Var

Hyères / Salins des Pesquiers, 1 ad. clair, 24 mars 2005 (Issa Nidal)

Hyères / Ile du Levant, 3 ad., photo, 22 août 2005 (Issa Nidal, Zammit André), 2 clairs et 1 sombre

Hyères / Ile du Levant, 1 ind. clair, 25 mars 2006 (Issa Nidal)

Classiquement cette espèce s'observe régulièrement en Camargue mais aussi sur le littoral varois. Les données de mars sont plutôt très précoces.

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (8/8)

Niche dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes d'Eurasie. Hivernent en Afrique sub-saharienne.

Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet / Etang de Vaugrenier, 1 ind., 19 et 25 février 2004 (Kern Patrick)

Bouches-du-Rhône

Port-Saint-Louis-du-Rhône / They de Roustan, 1 ind., 4 avril 2004 (Paulus Guillaume)

Arles / Mas Neuf, 1 ad., 13 avril 2005 (Hargreaves Andrew)

Var

Hyères / Salins des Pesquiers, 1 ad., 14 avril 2005 (Issa Nidal, Coillet Agnès)

Hyères / Salins des Pesquiers, 1 ad., 22 mars 2006 (Issa Nidal)

Vaucluse

Courthézon / Etang Salé, 1 ind., 20 février 2004 (Blanc Gilles)

Courthézon / Etang Salé, 1 plumée, photo, 15 mars 2004 (Blanc Gilles)

Courthézon / Etang Salé, 1 ind., 18 mars 2004 (Blanc Gilles)

Les observations se concentrent classiquement en mars et avril, avec cependant des individus assez précoces.

MARQUETTE POUSSIN *Porzana parva* (1/1)

Niche de façon dispersée en Europe de l'Ouest, puis de façon plus continue jusqu'à l'Asie centrale et au nord-ouest de la Chine.

Bouches-du-Rhône

Arles / Le Verdier, 1 mâle ad., 9 avril 2006 (Peignot Cédric, Renoult Julien)

Homologable depuis le 1^{er} janvier 2006. Cette unique donnée paraît bien isolée...

RALE DES GENETS *Crex crex* (1/1)

Niche de l'Europe de l'ouest à la Sibérie et à la Chine. En fort déclin.

Bouches-du-Rhône

Arles / Boisverdun, 1 ind., 10 août 2005 (Kayser Yves)

Les observations de cette espèce en PACA sont particulièrement peu nombreuses.

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* (1/1)

Niche dans la toundra russe, dans les massifs montagneux d'Ecosse, de Scandinavie, d'Europe centrale et méridionale. Hivernage en Afrique du Nord principalement.

Bouches-du-Rhône

Plaine de la Crau, 1 ind., 11 janvier 2004 (Valet Nicolas)
Donnée hivernale remarquable.

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos* (1/1)

Niche de l'Arctique nord-américain et en Sibérie. Migrateur rare en France.

Bouches-du-Rhône

Saint-Chamas / Les Palous, 1 ad., du 15 au 20 mai 2006 (Louvel Thiéry)
Soumis à homologation depuis le 1^{er} janvier 2006. Les données de printemps sont rares.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis* (29/51)

Niche des zones steppiques aux régions boréales de la Biélorussie à l'Asie centrale et hiverne au sud du Sahara, dans le sous-continent indien et en Asie du sud-est.

Bouches-du-Rhône

Arles / Piémanson, 2 ind., 28 et 29 mars 2004 (Kayser Yves, Thibault Marc & al.)
Arles / Salin de badon, 4 ind. 1A, photo, 25 septembre 2004 (Palomarès Vincent, Bazin Nicolas)
Arles / Piémanson, 1 ind., 16 mars 2005 (Kayser Yves, Vialet E.)
Arles / Mas de l'Ange, 2 ad., 25 avril 2005 (Issa Nidal, Baeta Renaud, Liger Alexandre)
Arles / Salin de Badon, max 7 ind., photo, du 15 août 2005 au 28 août 2005 (Kayser Yves, Palomarès Vincent, Bazin Nicolas & al.)
Arles / Palunette de Fiérouse, 3 ad., photo, 28 et 29 avril 2006 (Palomarès Vincent & al.)

Hautes-Alpes

Mison / Lac, 1 ind., photo, 3 avril 2004 (Gattus Jean-Christophe)

Var

Hyères / Vieux Salins, 2 ad., 16 mars 2005 au 18 mars 2005 (Issa Nidal, Boccon Marie-Laure)
Fréjus / Etang de Villepey, 1 ind., photo, 24 mars 2005 (Soldi Olivier, Droisy Bruno & al.)
Hyères / Vieux Salins, 2 ad., 1 avril 2005 au 3 avril 2005 (Issa Nidal)
Hyères / Salins des Pesquiers, 1 ad., 3 avril 2005 (Issa Nidal)
Hyères / Vieux Salins, 2 ad., photo, 6 avril 2005 au 8 avril 2005 (Issa Nidal)
Hyères / Salins des Pesquiers, 2 ad., 18 avril 2005 au 22 avril 2005 (Issa Nidal, Coillet Agnès)
Fréjus / Etang de Villepey, 1 ad., photo, 29 avril 2005 (Fossé Alain)
Hyères / Salins des Pesquiers, 2 ad., 28 juillet 2005 (Issa Nidal)
Hyères / Salins des Pesquiers, 1 ind. 1A, photo, 29 juillet 2005 au 1 août 2005 (Issa Nidal)
Hyères / Salins des Pesquiers, 1 ind. 1A, photo, 2 août 2005 au 3 août 2005 (Issa Nidal, Coillet Agnès, Soldi Olivier)
Hyères / Salins des Pesquiers, 2 ind H1, photo, 23 et 24 août 2005 (Issa Nidal)
Hyères / Salins des Pesquiers, 3 ind. H1, photo, 29 août 2005 (Issa Nidal, Soldi Olivier)
Hyères / Salins des Pesquiers, 1 ad., du 12 au 15 mars 2006 (Issa Nidal)
Hyères / Vieux Salins, 2 ad., photo, 2 avril 2006 (Issa Nidal, Coillet Agnès)
Hyères / Marais Redon, 1 ad., 13 avril 2006 (Issa Nidal, Coillet Agnès)
Hyères / Salins des Pesquiers, 1 ad., photo⁴, 14 avril 2006 (Issa Nidal)
Hyères / Salins des Pesquiers, 1 ad., photo, du 15 au 21 avril 2006 (Issa Nidal, Chartendraul Jean-Michel)



⁴ Chevalier stagnatile, Hyères, 14/04/2006 N. Issa

Hyères / Vieux Salins, 1 ad., photo, 26 avril 2006 (Issa Nidal, Bernardi Jérôme)

Hyères / Salins des Pesquiers, 2 ad., photo, 23 juillet 2006 (Issa Nidal)

Hyères / Salins des Pesquiers, 1 juv., photo, du 22 au 30 août 2006 (Issa Nidal, Sénéchal Vincent)

Vaucluse

Monteux / Les Confines, 1 ad., 29 mai 2006 au (Blanc Gilles)

Cette espèce s'observe régulièrement en Camargue et sur le littoral varois, mais plus rarement à l'intérieur des terres. N'est plus soumis à homologation depuis le 1^{er} janvier 2007.

BECASSINE SOURDE *Lymnocryptes minimus* (1/1)

Niche dans les zones boréales et subarctiques de la Fennoscandie à la Sibérie orientale. Hiverné en Europe de l'ouest et du sud, en Afrique du Nord, au nord des zones afro-tropicales, au Moyen-Orient, à l'est jusqu'au Vietnam.

Var

Fréjus / Etangs de Villepey, 1 ind., photo⁵, 14 mars 2004 (Huin Denis, Joyeux André), capturé.

Espèce largement sous-estimée si l'on en juge le nombre d'individus tués à la chasse...



PHALAROPE A BEC ETROIT *Phalaropus lobatus* (3/4)

Niche tout autour du Grand Nord, y compris en Islande. Migre volontiers au-dessus des terres. Hivernage pélagique, surtout en Mer d'Arabie pour les populations européennes.

Var

Hyères / Salins des Pesquiers, 1 fem. ad., photo⁶, 1^{er} au 5 mai 2005 (Issa Nidal, Vaslin Matthieu)

Hyères / Salins des Pesquiers, 2 ind., ad. et juv., photo, 31 août 2005 (Issa Nidal, Coillet Agnès)

Hyères / Salins des Pesquiers, 1 fem. ad., photo, 10 au 15 mai 2006 (Issa Nidal)

Belle série d'observation aux salins d'Hyères.



GRAND LABBE *Catharacta skua* (2/2)

Niche en Islande, aux Féroé, dans le nord de l'Ecosse, au Spitzberg, en Norvège et au nord-ouest de la Russie. Hiverné en Atlantique et en Méditerranée.

Bouches-du-Rhône

Arles / Etang du Vaccarès, 1 ind., 7 octobre 2005 (Mauras D.)

Var

Hyères / Port-Cros, 1 ind., 16 février 2004 (Larchevêque Richard), entre le Lavandou, Port-Cros et Cap Bénat.

Peu d'observations parvenues au CHR PACA. Est-ce une réalité ?

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus* (5/12)

Niche dans la tundra circumpolaire en en Ecosse. Hiverné en très grande majorité dans l'hémisphère sud.

Bouches-du-Rhône

Arles / Piémanson, 1 ad., 15 mars 2004 (Paulus Guillaume)

Arles / Piémanson, 1 ad. clair, 5 mai 2004 (Kayser Yves)

Arles / Piémanson, 1 ad. sombre, 10 mai 2004 (Kayser Yves)

Arles / Golfe de beauduc, 2 ind., 15 mai 2004 (Palomarès Vincent)

Arles / Golfe de beauduc, 7 ind., 16 mai 2004 (Palomarès Vincent)

Peu de fiches parvenues, mais nous avons décidé de retirer cette espèce de la liste.

⁵ Bécassine sourde, Fréjus, 14/03/2004, A. Joyeux

⁶ Phalarope à bec étroit, Hyères, 01/05/2005, N. Issa

GOELAND D'AUDOUIN *Larus audouinii* (3/3)

Niche sur les îles et côtes de la mer Méditerranée (mais surtout en Espagne). De passage sur les côtes méditerranéennes françaises.

Var

Hyères / Salins des Pesquiers, 1 ind. E3, photo, 10 avril 2006 (Issa Nidal)

Hyères / Salins des Pesquiers, 1 ind. E2, 26 avril 2006 (Issa Nidal)

Hyères / Salins des Pesquiers, 1 ind. H1, photo⁷, 30 août 2006 (Issa Nidal)

Soumis à homologation depuis le 1er janvier 2006. Belle série d'observation à Hyères grâce à un observateur attentif !

**GOELAND A BEC CERCLE *Larus delawarensis* (1/1)**

Niche en Amérique du Nord.

Bouches-du-Rhône

Berre l'Étang / Salins de Berre, 1 E1, 23 mars 2006 (Louvel Thiéry)

Les observations en PACA sont très rares. Soumis à homologation depuis le 1^{er} janvier 2006.

GOELAND ARGENTE *Larus argentatus* (2/2)

Espèce polytypique niche dans le nord-ouest de l'Europe, de l'Islande à la mer Blanche, au sud jusqu'à l'ouest de la France et au Pays basque espagnol. Argentatus se reproduit dans la partie nord, en Scandinavie et au sud de la Baltique et argenteus de l'Europe occidentale à l'Islande.

Bouches-du-Rhône

Arles / Beauduc, 1 ad., photo, 28 novembre 2004 (Palomarès Vincent, Bazin Nicolas)

Arles / Piémanson, 1 ad., 15 mars 2005 (Kayser Yves, Arnaud Antoine)

Peu d'observation de ce goéland mais en étant attentif, on finit par en trouver.

GOELAND BRUN *Larus fuscus* (11/13)

Espèce polytypique faisant l'objet de controverse taxonomique. Traditionnellement, trois sous-espèces sont reconnues en Europe : L. f. fuscus (Goéland de la Baltique) nichant en Scandinavie, L. f. intermedius nichant en Norvège, Danemark et L. f. graellsii nichant dans l'ouest de l'Europe.

Bouches-du-Rhône

Arles / Baisse des 500 frs, 1 ind. E3, 29 mars 2004 (Kayser Yves)

Arles / Esquineau clos 7, 1 ad. *graellsii*, 2 avril 2004 (Kayser Yves)

Arles / Baisse des 500 frs, 1 ad. *fuscus*, 15 mars 2005 (Kayser Yves, Arnaud Antoine)

Arles / Baisse des 500 frs, 1 ad. *fuscus*, 22 mars 2005 (Kayser Yves), individu différent de la donnée précédente.

Hautes-Alpes

Crots, 1 ad. *intermedius*, 21 septembre 2004 (Combrisson Damien)

Crots, 1 ind. 3A *intermedius*, 12 et 17 décembre 2004 (Combrisson Damien)

Crots, 1 ad. *graellsii*, 22 décembre 2004 (Combrisson Damien, Eyraud Olivier)

Var

Hyères / Salins des Pesquiers, 1 ad. *graellsii*, 22 mars 2006 (Issa Nidal)

Garéoult, 1 ad., photo, 25 mars 2006 (Viricel Gilles)

Hyères / Salins des Pesquiers, 3 ad., 29 mars 2006 (Issa Nidal), dutch-type probable.

Hyères / Vieux Salins, 1 ad. *intermedius*, 13 avril 2006 (Issa Nidal)

Le CHR a retiré l'espèce de la liste. Seul le Goéland de la Baltique (sous-espèce *fuscus* du Goéland brun) y est maintenu.

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (2/2)

Niche de la Mer Noire au Kazakhstan et ponctuellement en Europe centrale. Semble en expansion vers l'ouest.

Bouches-du-Rhône

⁷ Goéland d'Audouin, Hyères, 30/08/2006, N. Issa

Arles / Etang du Fangassier, 1 ind. H3, 28 août 2005 (Palomarès Vincent)

Saint-Chamas / Les Palous, 1 ind. H1/E1, 5 mars 2006 (Louvel Thiéry)

Il faut être très attentif pour détecter cette espèce. La récente littérature sur le sujet a permis une meilleure identification sur le terrain.

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus* (2/2)

Niche de l'Europe de l'Est à la Sibérie orientale (région de l'Amour). Hivernent principalement en Afrique tropicale.

Bouches-du-Rhône

Arles / Baisse des 500 frs, 1 juv., 2 septembre 2004 (Kolbeinsson Yann, Robert M.)

Arles / Mas d'Agon, 1 ad., 27 septembre 2006 (Peignot Cédric)

Depuis le 1^{er} janvier 2007, seules les observations de l'espèce en période postnuptiale (adultes et jeunes) sont soumises à homologation.

ALOUETTE CALANDRE *Melanocorypha calandra* (1/3)

Niche au Maghreb, sud de l'Europe jusqu'en Turquie et Iran.

Bouches-du-Rhône

Arles / Beauduc, 3 ind., 23 avril 2005 (Franc Emmanuel, Jeangeorges Nathalie, Perrier Thomas)

L'Alouette calandre est réputée sédentaire en France, mais des observations ponctuelles sont réalisées au printemps sur des sites où elle ne niche pas. En 2005, un afflux inhabituel a touché la France.

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla* (1/8)

La forme nominale niche en Europe, de la péninsule ibérique à l'ex-Yougoslavie. Hivernent au sud du Sahara.

Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau / Grosse du Centre, 8 ind., 22 février 2004 (Hargreaves Andrew)

Cette observation est particulièrement précoce.

PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (6/23)

Niche du nord de la Scandinavie à l'Alaska. Hivernent surtout au sud du Sahara.

Bouches-du-Rhône

Sénas / Iscles de Malespine, 1 ind., 13 avril 2004 (Oliosio Georges)

Arles / Piémanson, 1 ind., 26 avril 2004 au 29 avril 2004 (Kayser Yves, Vincent-Martin Nicolas, Thibault Marc)

Arles / La Fangouse, 14 ind., 28 avril 2004 (Kayser Yves, Kowalski Hubert)

Var

Hyères / Ile du Levant, 1 fem. ad., 12 mai 2005 (Issa Nidal, Zammit André)

Hyères / Salins des Pesquiers, 2 ad., photo⁸, 18 avril 2006 (Issa Nidal)

Hyères / Salins des Pesquiers, min 4 ad., 19 avril 2006 (Issa Nidal)

Toutes les observations concernent des migrateurs pré-nuptiaux.



BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarrellii* (2/2)

Niche surtout dans les Iles Britanniques. Hivernent le long des côtes de l'atlantique.

Alpes de Haute Provence

Valensole, 1 mâle adulte, 27 octobre 2005 (Bouvin Laurent)

Var

Hyères / Vieux Salins, 1 mâle adulte, 14 décembre 2005 (Schont André)

Sous-espèce très occasionnelle en PACA.

BERGERONNETTE FLAVEOLE *Motacilla flava flavissima* (4/6)

⁸ Pipit à gorge rousse, Hyères, 18/04/2006, N. Issa

LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE *Locustella luscinioides* (3/3)

La sous-espèce type niche au nord-ouest de l'Afrique, en Europe, à l'est jusqu'à la mer d'Azov en Russie. Migrateur transsaharien hivernant dans les régions subsahariennes du Sénégal à l'Erythrée.

Bouches-du-Rhône

Arles / Piémanson, 1 ind., 15 mai 2004 (Kayser Yves)

Arles / Piémanson, 1 ind., 8 mai 2005 (Kayser Yves)

Arles / Piémanson, 1 ind. H1, 22 septembre 2005 (Kayser Yves)

Toutes les observations proviennent d'une station de baguage de Camargue.

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola* (1/1)

Niche de l'est de l'Allemagne à l'est de la Russie d'Europe.

Bouches-du-Rhône

Arles / Le Verdier, 1 ind., photo¹⁰, 16 avril 2006 (Nabholz Benoit)

Seule mention parvenue au CHR.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* (3/3)

Se reproduit du nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et l'est de l'Oural. Hivérne dans le sud-est de l'Afrique.

Bouches-du-Rhône

Arles / They de Ste Ursule, 1 ind., photo¹¹, 25 avril 2004 (Durand Guy, Dhermain Frank, Franc Emmanuel)

Arles / Piémanson, 1 ad., photo, 15 mai 2004 (Kayser Yves, Larousse Alban, Vincent-Martin Nicolas & al.), capturé.

Arles / Tour du Valat, 1 ind. H1, 22 septembre 2005 (Kayser Yves, Dorgère A.), capturé.

Les rares données proviennent de Camargue, surtout issues du baguage.

HYPOLAÏS ICTERINE *Hippolais icterina* (5/5)

Niche des côtes de la Mer du Nord jusqu'à la Sibérie occidentale. Hivérne en Afrique, principalement au sud de l'équateur.

Bouches-du-Rhône

Arles / Piémanson, 1 ad., 12 mai 2004 (Kayser Yves, Kowalski Hubert, Jourdain Elsa)

Arles / Boisverdun, 1 ind., 14 mai 2004 (Kayser Yves,), capturé.

Arles / Piémanson, 1 ad., photo¹², 15 mai 2004 (Kayser Yves, Flitti Amine, Vincent-Martin Nicolas, Paulus Guillaume), capturé.

Arles / Beauduc, 1 ind., 15 mai 2004 (Palomarès Vincent)



¹⁰ Phragmite aquatique, Arles, 16/04/2006, B. Nabholz

¹¹ Rousserolle verderolle, Arles, They de Ste Ursule, 25/04/04, F. Dhermain

¹² Hypolaïs icterine, Arles, 15/05/2004, A. Flitti

Vaucluse

Cheval-Blanc / Les Mayorques, 1 ind., photo, 22 mai 2005 (Flitti Amine, Moyon Claude & al.)
Là encore, presque toutes les données proviennent de Camargue et concernent le mois de mai. Cette espèce est probablement sous-détectée.

FAUVETTE PASSERINETTE CORSE *Sylvia cantillans moltonii* (1/1)

Niche en Corse, Sardaigne et aux Iles Baléares.

Bouches-du-Rhône

Arles / Piémanson, 1 fem., 2 mai 2004 (Kayser Yves, Bouffet Claudine)
Cette sous-espèce atteint parfois nos côtes. Il faut une certaine expérience pour l'identifier. Le cri est très utile pour cela.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (1/1)

La sous-espèce nominale se reproduit de l'Europe de l'Ouest jusqu'au nord de l'Italie, le nord de l'ex-Yougoslavie, le Grand Caucase et le moyen bassin de la Volga. Hiverné en Afrique sub-saharienne, du Niger à l'Erythrée.

Bouches-du-Rhône

Arles / Piémanson, 1 ind. (mâle probable), 4 avril 2005 (Kayser Yves)
La fauvette babillarde est rarement contacté en halte migratoire, et en particulier dans l'ouest de la région.

POUILLOT VELOCE NORDIQUE *Phylloscopus collybita abietinus* (2/2)

Se reproduit de la Norvège et la Suède jusqu'à l'Oural.

Bouches-du-Rhône

Arles / Piémanson, 1 ind., 25 avril 2004 (Kayser Yves, Demongin Laurent, Jourdain Elsa), capturé.
Arles / Salin de Badon, 1 ind., 10 octobre 2005 (Oliosio Georges & al.), capturé.
N'est plus soumis à homologation à compter du 1^{er} janvier 2007.

GOBEMOUCHE A COLLIER *Ficedula albicollis* (10/11)

Niche dans la zone s'étendant du centre de l'Europe jusqu'à l'Oural aux environs du 55° parallèle est, et de manière plus discontinue au sud de l'Italie, en Suisse, en Allemagne et au nord-est de la France. Les quartiers d'hivernage se situent en Afrique tropicale.

Bouches-du-Rhône

Arles / Beauduc, 1 fem., 17 avril 2004 (Le Névé Arnaud)
Arles / Beauduc, 1 fem., 25 avril 2004 (Palomarès Vincent)
Arles / Grifeuille, 1 mâle ad., 28 avril 2004 (Kayser Yves)
Arles / Salin de Giraud, 1 ad., 28 août 2005 (Franc Emmanuel, Jeangeorges Nathalie)
Alleins, 1 ind. H1, 3 septembre 2005 (Flitti Amine)
Aix en Provence / Europole de l'Arbois, 1 mâle ad., photo, 16 avril 2006 (Hohener Patrick)
Arles / Beauduc, 2 fem., photo, 25 avril 2006 (Palomarès Vincent, Bazin Nicolas & al.)
Arles / Piémanson, 1 fem. ad., photo¹³, 25 avril 2006 (Palomarès Vincent, Kayser Yves & al.), capturé.
Arles / Boisverdun, 1 ind. H1, 11 septembre 2006 (Kayser Yves)

Var

Hyères / Ile de Porquerolles, 1 mâle ad., 11 avril 2005 (Issa Nidal, Coillet Agnès)
Le printemps 2004 a été un très bon crû pour le Gobemouche à collier sur l'ensemble du littoral méditerranéen avec pas moins de 67 observations pour 90 individus (GONIN et ZUCCA, 2005). Dans ce contexte, un Gobemouche à demi-collier a été capturé sur l'île de Porquerolles dans le Var fournissant une première pour la France.



GOBEMOUCHE GRIS CORSE *Muscicapa striata tyrrhenica* (3/3)

Niche en Corse et Sardaigne.

Bouches-du-Rhône

¹³ Gobemouche à collier, Arles, 25/04/2006, V. Palomarès

Arles / Piémanson, 1 ind., 29 avril 2005 (Kayser Yves), capturé.
Arles / Piémanson, 1 ind., 4 mai 2005 (Kayser Yves), capturé.
Arles / Piémanson, 1 ind., 8 mai 2005 (Kayser Yves)
Tous les contacts proviennent du même site et même observateur.

PIE-GRIECHE A POITRINE ROSE *Lanius minor* (8/18)

Niche de la Catalogne (population relictuelle) à l'Asie Centrale. Hiverné en Afrique du Sud.

Bouches-du-Rhône

Cuges-les-Pins, 1 ad., photo¹⁴, 20 mai 2004 (Viricel Gilles, Barthélémy Eric, Pélissier Robert)

Var

Signes, 1 ind., 13 juin 2004 (Viricel Gilles)

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, 1 ad., photo, 24 mai 2005 (Darmuzey Thierry, Viricel Gilles, Bircher Françoise)

Signes / Chibron, 1 ad., photo, 29 mai 2005 (Bircher Françoise, Viricel Gilles & al.)

Seillons-Source-d'Argens, 6 ind., 2 ad. et 4 juv., photo, 26 juin 2005 au 1 juillet 2005 (Darmuzey Thierry, Viricel Gilles, Bircher Françoise)

Ginasservis, 1 mâle ad., photo, 30 juillet 2005 (Flitti Amine)

Istres / Mas de Chauvet, 2 ad. et 2 juv., 9 juillet au 31 août 2005 (Flitti Amine & al.)

Istres / Mas de Chauvet, 2 ad. et 1 juv., photo, du 29 juillet au 13 août 2006 au moins (Flitti Amine & al.)

La plupart des observations se rapportent à des individus migrateurs (surtout fin mai). Mais l'année 2005 fut marquée par la découverte d'un couple nicheur dans le Var ainsi que dans la plaine de la Crau. Ce dernier fut recontacté en 2006.



PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor* (1/1)

Espèce polytypique dont la sous-espèce nominale niche sur un large front du centre de la France, au nord de la Russie, à l'est jusqu'au fleuve Yenisey.

Alpes-Maritimes

Andon, 1 ind., photo¹⁵, 29 décembre 2005 (Fonters R.)

Seule donnée parvenue au CHR de ce rare hivernant.



CORNEILLE MANTELEE *Corvus cornix* (23/42)

Niche dans le nord et l'est de l'Europe.

Alpes-Maritimes

Saint-Laurent-du-Var / Embouchure du Var, 1 ind., 7 janvier 2004 (Oliosio Georges)

Antibes, 1 ind., 14 janvier 2004 (Kern Patrick)

Saint-Laurent-du-Var / Embouchure du Var, 1 ind., photo, 21 mars 2005 (Soldi Olivier, Kern Patrick & al.)

Bouches-du-Rhône

Mallermort / Barrage, 2 ind., photo, 3 janvier 2004 au 8 mars 2004 (Jacotot Gil, Martinez Nicolas)

¹⁴ Pie-grièche à poitrine rose, Cuges-les-Pins, 20/05/2004, G. Viricel

¹⁵ Pie-grièche grise, Andon, 29/12/2005, R. Fonters

Arles / Mas Augéry des sansouires, 1 ind., 18 janvier 2004 (Vaslin Matthieu & al.)
Le Puy Sainte Réparate / Les Crottes, 3 ind., 23 février 2004 au 17 mars 2004 (Flitti Amine)
Le Puy Sainte Réparate, 1 ind., 14 novembre 2004 (Jacotot Gil & al.)
La Roque d'Anthéron, max. 3 ind., 14 novembre 2004 au 12 janvier 2005 (Jacotot Gil & al.)
Mallemort, 2 ind., 21 décembre 2004 au 23 février 2005 (Jacotot Gil)
Saint-Estève-Janson, 1 ind., photo, 13 mars 2005 (Nabholz Benoit)
Le Puy Sainte Réparate, 1 ind., 2 et 3 octobre 2005 (Durand Eric)
Meyrargues, 8 ind., photo, 20 octobre 2005 (Durand Eric), et 3 hybrides
Arles / Les Collocations, 1 ind., 16 et 17 décembre 2005 (Kayser Yves, Kowalski Hubert)
Arles / Bois de la Ville, 1 ind., photo, 18 décembre 2005 (Guillosson Tristan, Palomarès Vincent, & al.)
Arles / Le Sambuc, 2 ind., 25 décembre 2005 au 4 janvier 2006 (Kayser Yves, Paoli Jérôme & al.)

Hautes-Alpes

Châteauroux-les-Alpes, 1 ind., 14 janvier 2004 (Combrisson Damien, Couloumy Christian)
Châteauroux-les-Alpes, 1 ind., 15 novembre 2004 (Combrisson Damien,)
Eyglis, 1 ind., 24 novembre 2004 au 14 février 2005 (Combrisson Damien)
Crots, 1 ind., 12 décembre 2004 (Combrisson Damien)
Gap, 2 ind., photo, 2 au 20 février 2005 (Franc Emmanuel, Jeangeorges Nathalie)

Var

Fréjus / Parc Zoologique, 3 ind., photo, 13 février 2004 (Deliry Cyrille,) avec 1 hybride.
Les Arcs, 2 ind., 17 octobre 2005 (Soldi Olivier, Abba Alain & al.)
Pierrefeu-du-Var, 2 ind., 10 janvier 2006 (Lepoivre Christophe)
L'espèce se révèle être plus commune ces dernières années. Elle est bien présente en hiver dans l'est de la région, la vallée de la Durance et atteint régulièrement la Camargue. Elle n'est donc plus soumise à homologation.

CHOUCAS DES TOURS « A COLLIER » *Corvus monedula soemmerringii/monedula* (1/1)

Niche dans le nord et l'est de l'Europe. Hiverner plus au sud et à l'ouest.

Hautes-Alpes

Réotier, 1 ind., 14 février 2005 (Combrisson Damien)
Donnée unique parvenue au CHR.

ETOURNEAU UNICOLORE *Sturnus unicolor* (1/1)

Niche dans le Maghreb, en Espagne, Sicile, Sardaigne, Corse et dans le sud de la France

Bouches-du-Rhône

Arles / Mas de la Chartrouse, 1 mâle, 20 avril 2006 (Kayser Yves)
En dehors de la micro-population de Berre-l'étang, les observations de l'espèce demeurent très rare.
Soumis à homologation depuis le 1er janvier 2006.

NIVEROLLE ALPINE *Montifringilla nivalis* (1/2)

La forme nominale niche dans les massifs montagneux du nord de l'Espagne à la Grèce, en passant par les Alpes.

Bouches-du-Rhône

Saint-Antonin-sur-Bayon / Refuge Cézanne, 2 ind., 21 mars 2004 (Durand Guy, Durand Sébastien)

VENTURON MONTAGNARD *Serinus citrinella* (2/32)

Répartition restreinte à la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et à l'ex-Yougoslavie.

Alpes de Haute Provence

Manosque / Mont des Spels, 2 ind., 25 décembre 2003 au 31 janvier 2004 (Taylor P.)

Bouches-du-Rhône

Lambesc, 10 à 30 ind., photo, 21 décembre 2003 au 29 janvier 2004 (Durand Guy, Durand Eric, Durand Sébastien)
N'est plus soumis à homologation.

BOUVREUIL PIVOINE *Pyrrhula pyrrhula* (2/2)

Présent dans l'ensemble de l'Europe.

Bouches-du-Rhône

Arles / La Commanderie, 1 ind., 6 novembre 2005 (Kayser Yves)

Arles / Boisverdun, 1 ind., 23 et 24 novembre 2005 (Kayser Yves), individu « trompetteur »

N'est plus soumis à homologation. A noter l'observation d'un individu « trompetteur » dans le cadre d'un afflux en Europe de l'ouest.

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* (1/4)

Var

Fréjus / Etangs de Villepey, max. 4 ind., photo¹⁶ et ¹⁷, 15 au 28 novembre 2004 (Flitti Amine, Dhermain Frank, Soldi Olivier & al.)

Le Bruant des neiges se laisse rarement aussi bien observer dans notre région.



ANNEXE 1 – LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

Aigle botté *Hieraaetus pennatus*

Bouches-du-Rhône – Arles / Mas d'Agon, 1 ind., 17 octobre 2004 (*absence complète de description*).

Bouches-du-Rhône – Arles / Salin de Badon, 1 ind., 8 janvier 2005 (*absence complète de description*).

Bouches-du-Rhône – Arles / Grand Romieu, 1 ind., 9 janvier 2005 (*absence complète de description*).

Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer / Pont de Sylvéreal, 1 ind., 1 février 2005 (*absence complète de description*).

Bouches-du-Rhône – Arles / Marais du Vigueirat, 1 ind., 2 février 2005 (*absence complète de description*).

Bouches-du-Rhône – Saint-Martin-de-Crau / Peau de Meau, 1 ind., 26 août 2006 (*description trop sommaire*)

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*

Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer / Pont de Sylvéreal, 1 ind., 3 février 2005 (*absence complète de description*).

Faucon d'Eléonore *Falco eleonora*

Bouches-du-Rhône – Mallemort / Barrage, 1 ind. sombre, 15 août 2004 (*description trop sommaire*).

Var – Six-Fours-les-Plages, 2 ad., 8 octobre 2005 (*description ne permettant pas d'exclure un faucon pèlerin*)

Faucon pèlerin nordique *Falco peregrinus calidus*

Bouches-du-Rhône – Plaine de la Crau, 1 ind., 2 février 2005 (*description ne permettant pas d'exclure peregrinus*).

Goéland brun de type *intermedius* *Larus fuscus intermedius*

¹⁶ Bruant des neiges, Fréjus, 26/11/2004, A. Flitti

¹⁷ Bruant des neiges, Fréjus, 26/11/2004, F. Dhermain

Hautes-Alpes – Espinasse, 2 ad., 31 janvier 2004 (*voir explication dans l'introduction de ce rapport*)

Sterne hansel *Sterna nilotica*

Var – Six-Fours-les-Plages, 1 ind., 11 novembre 2004 (*description incomplète*).

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*

Bouches-du-Rhône – Arles / Piémanson, 1 ind., 25 avril 2004 (*identification basée uniquement sur le cri*)

Var – Hyères / Salins des Pesquiers, 1 ind., 28 mars 2004 (*description évoquant un Pipit spioncelle acquérant un plumage nuptial*)

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarellii*

Alpes-Maritimes – Saint-Laurent-du-Var / Embouchure du Var, 1 mâle ad., 12 mars 2004 (*description insuffisante*).

Hypolaïs icterine *Hippolaïs icterina*

Bouches-du-Rhône – Rognac / Plateau de L'Arbois, 1 ind., 17 mai 2004 (*désaccord entre les observateurs*).

Locustelle lusciniôïde *Locustella luscinioides*

Bouches-du-Rhône – Aubagne, 1 ind., 4 octobre 2004 (*description insuffisante ne permettant pas d'exclure une Bouscarle de Cetti*).

Pouillot véloce nordique *Phylloscopus collybita abietinus*

Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer / Baisse du Radeau, 1 ind., photo, 23 mars 2004 (critères évoquant un individu intermédiaire)

Gobemouche nain *Ficedula parva*

Alpes-Maritimes – Saint-Laurent-du-Var / Embouchure du Var, 1 ind., 16 avril 2006 (*description incomplète*)

Corneille mantelée *Corvus cornix*

Var –Lalonde-les-Maures, 4 ind., 22 novembre 2005 (*absence complète de description*).

Venturon montagnard *Serinus citrinella*

Bouches-du-Rhône – Arles / L'auricet, 3 ind., 14 février 2004 (*description incomplète*).

REMERCIEMENTS

Le CHR PACA tient à remercier chaleureusement ceux qui au cours de cette période, ont contribué à son bon fonctionnement :

- La LPO PACA pour le soutien financier et logistique qu'elle apporte au secrétariat du Comité.
- La Tour du Valat et le CEEP pour leur contribution financière.
- La LPO Nationale et la revue *Ornithos* pour la diffusion des informations relatives au Comité.
- Sébastien et Eric Durand pour héberger le CHR PACA sur leur site <http://oiseauxprovence.free.fr>
- L'ensemble des ornithologues, naturalistes, dessinateurs et photographes sans qui le CHR PACA ne fonctionnerait pas.

Et pour finir, un grand merci à Cyril Girard qui a conçu le logo du CHR PACA.

BIBLIOGRAPHIE

DUBOIS P.-J., LE MARECHAL P., OLIO SO G. & YESOU P. (2000). *Inventaire des oiseaux de France*. Nathan, 397 p.

GONIN J., ZUCCA M. (2005). Afflux de Gobemouches à collier *Ficedula albicollis* dans le sud-est de la France au printemps 2004. *Ornithos* 12 (2) : 94-101.

GUILLOSSON T., GARCIA F. & JARDIN M. (2006). « Rétromigration » d'Aigles bottés *Hieraaetus pennatus* dans le Midi de la France à l'automne 2004. *Ornithos* 13 (1).

PAUL J.-P. & OLIO SO G. (2006). Afflux mémorable de Jaseurs boréaux *Bombycilla garrulus* en France dans l'hiver 2004-2005. *Ornithos* 13 (1) : 2 - 11.

ZUCCA M. & LE CMR (2005). Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France. 2^{ème} rapport du CMR (jan. 2001 - déc. 2002). *Ornithos* 12 (5) : 233 - 260.

**Liste des espèces homologables en Provence-Alpes Côte d'Azur
(au 01 janvier 2007 sauf espèces anciennement CHN au 01 janvier 2006)**

<u>Plongeon imbrin</u> <i>Gavia immer</i>	<u>Goéland à bec cerclé</u> <i>Larus delawarensis</i>
<u>Grèbe jougris</u> <i>Podiceps grisegena</i>	<u>Goéland marin</u> <i>Larus marinus</i>
<u>Fulmar boréal</u> <i>Fulmarus glacialis</i>	<u>Goéland bourgmestre</u> <i>Larus hyperboreus</i>
<u>Puffin fuligineux</u> <i>Puffinus griseus</i>	<u>Sterne de Dougall</u> <i>Sterna dougallii</i>
<u>Puffin des Anglais</u> <i>Puffinus puffinus</i>	<u>Sterne arctique</u> <i>Sterna paradisaea</i>
<u>Puffin des Baléares</u> <i>Puffinus mauretanicus</i>	<u>Guifette leucoptère</u> <i>Chlidonias leucopterus</i> (migration postnuptiale)
<u>Océanite tempête</u> <i>Hydrobates pelagicus</i>	<u>Guillemot de Troil</u> <i>Uria aalge</i>
<u>Océanite culblanc</u> <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	<u>Mergule nain</u> <i>Alle alle</i>
<u>Cormoran huppé</u> <i>Phalacrocorax a. desmarestii</i> (sauf Iles de Marseille et d'Hyères)	<u>Chouette de Tengmalm</u> <i>Aegolius funereus</i> (sauf arc alpin)
<u>Ibis falcinelle</u> <i>Plegadis falcinellus</i> (sauf Camargue)	<u>Pic cendré</u> <i>Picus canus</i>
<u>Ibis sacré</u> <i>Threskiornis aethiopicus</i> (sauf Camargue)	<u>Alouette calandre</u> <i>Melanocorypha calandra</i> (sauf sites de reproduction)
<u>Spatule blanche</u> <i>Platalea leucorodia</i> (sauf Camargue)	<u>Alouette hausse-col</u> <i>Eremophila alpestris</i>
<u>Cygne chanteur</u> <i>Cygnus cygnus</i>	<u>Pipit à gorge rousse</u> <i>Anthus cervinus</i>
<u>Cygne de Bewick</u> <i>Cygnus c. bewickii</i> (sauf Camargue)	<u>Pipit maritime</u> <i>Anthus petrosus</i>
<u>Oie rieuse</u> <i>Anser albifrons</i>	<u>Pipit de Richard</u> <i>Anthus richardi</i>
<u>Oie des moissons</u> <i>Anser fabalis rossicus</i>	<u>Bergeronnette de Yarrell</u> <i>Motacilla alba yarrellii</i>
<u>Bernache cravant</u> <i>Branta bernicla</i>	<u>Bergeronnette flavéole</u> <i>Motacilla flava flavissima</i>
<u>Bernache nonnette</u> <i>Branta leucopsis</i>	<u>Jaseur boréal</u> <i>Bombycilla garrulus</i>
<u>Tadorne casarca</u> <i>Tadorna ferruginea</i>	<u>Locustelle lusciniotide</u> <i>Locustella luscinioides</i> (sauf site de reproduction de Crau)
<u>Fuligule milouinan</u> <i>Aythya marila</i> (sauf Camargue)	<u>Rousserolle verderolle</u> <i>Acrocephalus palustris</i> (sauf sites de reproduction alpins)
<u>Fuligule nyroca</u> <i>Aythya nyroca</i>	<u>Phragmite aquatique</u> <i>Acrocephalus paludicola</i>
<u>Fuligule à bec cerclé</u> <i>Aythya collaris</i>	<u>Fauvette passerinette</u> corse <i>Sylvia cantillans moltonii</i>
<u>Harelde boréale</u> <i>Clangula hyemalis</i>	<u>Fauvette babillarde</u> <i>Sylvia curruca</i> (sauf sites de reproduction alpins)
<u>Harle piette</u> <i>Mergus albellus</i>	<u>Pouillot ibérique</u> <i>Phylloscopus ibericus</i>
<u>Harle bièvre</u> <i>Mergus merganser</i> (sauf Hautes-Alpes)	<u>Pouillot à grands sourcils</u> <i>Phylloscopus inornatus</i>
<u>Erismature rousse</u> <i>Oxyura jamaicensis</i>	<u>Gobemouche gris corse</u> <i>Muscicapa striata tyrrhenica</i>
<u>Pygargue à queue blanche</u> <i>Haliaeetus albicilla</i>	<u>Gobemouche à collier</u> <i>Ficedula albicollis</i>
<u>Gypaète barbu</u> <i>Gypaetus barbatus</i> (hors des Alpes)	<u>Gobemouche nain</u> <i>Ficedula parva</i>
<u>Faucon d'Eléonore</u> <i>Falco eleonora</i>	<u>Grimpeur des bois</u> <i>Certhia familiaris</i> (en dehors du massif alpin)
<u>Faucon crécerellette</u> <i>Falco naumanni</i> (sauf Crau)	<u>Pie-grièche à poitrine rose</u> <i>Lanius minor</i>
<u>Perdrix grise</u> <i>Perdix perdix</i>	<u>Pie-grièche à tête rousse</u> ssp <i>badius</i> <i>Lanius senator badius</i>
<u>Râle des genêts</u> <i>Crex crex</i>	<u>Pie-grièche grise</u> <i>Lanius excubitor</i>
<u>Marouette ponctuée</u> <i>Porzana porzana</i>	<u>Chocard à bec jaune</u> <i>Pyrrhocorax graculus</i> (hors massif alpin)
<u>Marouette poussin</u> <i>Porzana parva</i>	<u>Choucas des tours « à collier »</u> <i>Corvus monedula soemmerringii/monedula</i>
<u>Talève sultane</u> <i>Porphyrio porphyrio</i>	<u>Etourneau unicolore</u> <i>Sturnus unicolor</i>
<u>Bécasseau violet</u> <i>Calidris maritima</i>	<u>Niverolle alpine</u> <i>Montifringilla nivalis</i> (en plaine)
<u>Bécasseau tacheté</u> <i>Calidris melanotos</i>	<u>Sizerin cabaret</u> <i>Carduelis cabaret</i> (en plaine)
<u>Bécassine sourde</u> <i>Lymnocyptes minimus</i>	<u>Linotte à bec jaune</u> <i>Carduelis flavirostris</i>
<u>Phalarope à bec large</u> <i>Phalaropus fulicarius</i>	<u>Bruant lapon</u> <i>Calcarius lapponicus</i>
<u>Phalarope à bec étroit</u> <i>Phalaropus lobatus</i> (sauf Camargue)	<u>Bruant des neiges</u> <i>Plectrophenax nivalis</i>
<u>Grand labbe</u> <i>Catharacta skua</i>	
<u>Labbe pomarin</u> <i>Stercorarius pomarinus</i>	
<u>Labbe à longue queue</u> <i>Stercorarius longicaudus</i>	
<u>Goéland argenté</u> <i>Larus argentatus</i>	
<u>Goéland de la Baltique</u> <i>Larus f. fuscus</i>	
<u>Goéland pontique</u> <i>Larus cachinnans</i>	
<u>Goéland railleur</u> <i>Larus genei</i> (sauf Camargue)	
<u>Goéland d'Audouin</u> <i>Larus audouinii</i>	

Enfin, toutes les espèces à dates ou lieux atypiques comme par exemple : Busard cendré *Circus pygargus* en février ; Blongios nain *Ixobrychus minutus* en novembre ; Circaète *Circaetus gallicus* en hiver ; Rémiz *Remiz pendulinus* en période de reproduction ; Faucon kobez *Falco vespertinus* en période de reproduction, etc.
Ainsi que toutes les espèces n'ayant pas encore été observées en Provence et ne figurant pas dans la liste des oiseaux à homologation nationale, et les espèces exotiques s'établissant en France.